

الجمهورية اليمنية
وزارة الزراعة والري
المهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي
محطة البحوث الزراعية بتهامة



صنف : (سيتي لا جوس 7931)

إعداد


د / علي الشراعي

م / إبراهيم محمد المقبع

م / درهم عبده المهدى نعمان

الحديدة - 2002 م

أبريل 2002



الجمهورية اليمنية
وزارة الزراعة والري
الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي
محطة البحوث الزراعية بتهمة

الشامية

صنف: (سپتی لا جوس 7931)

أعداد

د / علي الشراعي

م / درحم عبد المهدي نعمان م / إبراهيم محمد المقبع

الحدیدة - 2002 م

أجبيش 2002

المحتويات

الصفحة الموضوع

.....	كلمة شكر
3	المقدمة
5	أهم الأنشطة المنفذة للصنف
8	الصنف
9	التربة المناسبة وتحضير الأرض
9	مواعيد الزراعة
9	طرق الزراعة
10	كميات البذور
10	التسميد
10	الترقيع
10	الخف
12	الري
12	مكافحة الآفات الزراعية
14	الحصاد
15	التخزين
15	انتقاء البذور
16	المادة العلمية
16	للاستفسار

كلمة شكر

نشكر كل من ساهم في تنفيذ وتقديم الأنشطة المختلفة وكل من ساهم في توفير البيانات من الاخوة الباحثين والفنين ومحظي المادة الإرشادية والمرشدين بالهيئة العامة لتطوير تهامة (TDA) والمزارعين والتي ساعدت لإخراج هذا العمل .

كما نشكر قيادة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي (AREA) على الدعم لإنجاز هذا العمل .

كما نخص بالشكر قيادة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD) على التعاون في طباعة هذه النشرة .

المدير الفني بمحطة البحوث الزراعية بتهامة


د. علي عبد الله الشراعي

صورة الغلاف⁽²⁾

نشرة رقم : 2
2002

الذرة الشامية (*Zea Mayz*) محصول علفي نجيلي شتوي . ويعتبر من أهم محاصيل الحبوب الغذائية في الجمهورية اليمنية حيث المساحة المزروعة بها للأعوام ٢٠٠٠ / ٩٦ م قد بلغت ٣٧.٧ ألف هكتار ومتوسط إنتاجية بلغت ٥٣ ألف طن^(٩) وهذه الإنتاجية لا تلبي احتياجات البلاد لذا فقد تم استيراد حبوب ذرة شامية غير مطحون في عام ٢٠٠٠ م كمية بلغت ١٩١ ألف طن ويبلغ قدره ٣٥٣٣٣٠٧٠٠٠ ريال^(٨) ويعود ذلك إلى نسبة المساحة المزروعة بهذا المحصول والتي تمثل ٥% من المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب بالجمهورية اليمنية أما المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية بمحافظة الحديدة فهي تمثل ١٥% من المساحة المزروعة لهذا المحصول على مستوى الجمهورية .

شكل يبين متوسط المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب بالألف هكتار للأعوام ٢٠٠٠ / ٩٦ م



وأهم المشاكل التي تواجه المزارعين هي تدني الإنتاجية والإصابة بدابة الأرض - النمل الأبيض (الأرضة) والمشكلة الأخيرة حدثت من زراعة الذرة الشامية أو أدت إلى حصاد الكيزان في الطور العجني واستخدامها خضراء وتحش النباتات كعلف أخضر ، والعمل جاري لإيجاد الحلول السريعة لها . وبشكل عام فالإنتاجية متدنية حيث بلغ متوسط إنتاجية الهكتار للأعوام ٢٠٠٠ / ٩٦ م في محافظة الحديدة (١ طن / هكتار)^(٩) ، ولهذا فقد عملت البحوث الزراعية على إدخال العديد من الأصناف عالية الإنتاجية من المركز الدولي لتحسين الذرة الشامية



بعض استخدامات الذرة الشامية

والقمح CIMMYT وتم تقييمها تحت ظروف تهامة في كلاً من المزرعة البحثية بالجرية (زبيد) والكدن (سردود) وقد تم التوصل إلى صنف سيتي لا جوس 1931 وأجريت له العديد من الدراسات (تقييم أصناف ، مواعيد زراعية، كثافة نباتية X تسميد، مقدنات مائية ، مكافحة النمل الأبيض - الأرضة والحسائش ومواعيد وكمية الري .. الخ) واتضح بأنه مبكر ومتوسط الطول واحتياجاته المائية قليلة بلغت 500 مم / موسم مقارنة بتهامة - 1

والتي بلغت 700 مم / موسم⁽⁴⁾ وعالي الإنتاجية ، حيث تفوقت غلته عن متوسط غلة الذرة الشامية في محافظة الحديدة لأعوام 96 / 2000 م بنسبة حوالي 375% تحت ظروف المزرعة البحثية^(9.4) ، وتزرع الذرة الشامية من أجل إنتاج الحبوب والتي تستعمل في تغذية الإنسان وفي إنتاج العليقة المركزية لتغذية الماشية والدواجن ، لكونها غنية بالنشا والمواد الدهنية وفقيرة بالسليلوز وتركيبها الكيماوي يتألف من 70% نشا و 10% مواد بروتينية و 4% مواد دهنية و 1.5% أملاح معdenية و 2.5 سليلوز و 13% ماء وتستخدم الذرة الشامية كعلف طازج أخضر أو على هيئة سيلاج ، أما المادة الجافة فيمكن قطعها أو طحنها وتقديمها كمادة مالئة للحيوان وقد يضاف إليها اليوريا لرفع قيمتها الغذائية⁽¹⁰⁾ بالإضافة إلى أن لها استعمالات أخرى كصناعة الزيوت .

**بسبب الإصابة
بالأرضة تحصد
الكيزان في الطور
العجيني وكعلف
أخضر**



أهم الأنشطة المنفذة للصنف سيتي لا جوس 7931



أخذ ملاحظات على نمو الصنف وارتفاع الكوز



أخذ ملاحظات على نمو الصنف ولون النورة المذكورة



نشاط كثافة X تسميد



نشاط مواعيد زراعية



نشاط مكافحة النمل الأبيض (الأرض)



نشاط مكافحة الحشائش



نشاط مواعيد وكمية الري (قيد التنفيذ)




اكتار بذور الصنف


1- الصنف :



سيتي لا جوس 7931 مدخل من المركز الدولي لتحسين النزرة الشامية والقمح CIMMYT مبكر النضج ويصل ارتفاعه إلى 190 سم وحبوبه صفراء برتقالية وينضج بعد حوالي مائة يوم من الزراعة وتصل متوسط إنتاجيته إلى 3.75 طن/هكتار من الحبوب و 7 طن/هكتار من العلف .



عدد الصفوف في الكوز



مقطع طولي وعرضي لنذرة الصنف



عدد البذور في الصف

2- التربة المناسبة وتحضير الأرض :

الذرة الشامية من المحاصيل المجهدة للتربة وتتطلب تربة خصبة مفككة جيدة التهوية والاحتفاظ بالماء غنية بالمواد العضوية ومعتدلة الحموضة ، وأفضل الأراضي لزراعتها هي الأراضي الصفراء الطينية ، ولا ينصح زراعتها في الأرضي الرملية إلا إذا أضيف الماء والسماد البلدي بكميات كبيرة والذرة الشامية شديدة الحساسية للملوحة ولا تزرع في الأراضي المالحة أو بمياه ري تحتوي على نسبة عالية من الملوحة ، ولزراعة الذرة الشامية تحضر الأرض جيداً عن طريق الحراثة العميقية ، ثم تروى وتحرث ثانية بالمحراث الكسار بعد أسبوعين من الري للقضاء على الحشائش ثم تسطح الأرض تمهيداً للزراعة .

3- مواعيد الزراعة :

أنسب مواعيد لزراعة الذرة الشامية صنف سيتي لا جوس 7931 هو الأسبوع الثاني من أغسطس وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر في مناطق وادي سردو وسهام، زبيد، ورماع.

4- طرق الزراعة :

تزرع الذرة الشامية بطريقتين:

أ- الزراعة في صفوف :

وهي الطريقة التقليدية لزراعة الذرة الشامية صنف (سيتي لا جوس 7931) حيث تحرث الأرض ويتم تزحيفها وتسويتها ، وتزرع البذور خلف المحراث في صفوف على أبعاد 70 سم . وبمسافة 25 - 50 سم بين النباتات والأخر.

ب- الزراعة في خطوط :

وهي الطريقة المفضلة لزراعة الذرة الشامية صنف (سيتي لا جوس 7931) في حالة الري بالأبار



الزراعة في خطوط

(ري دائم) ، ويتم حراثة الأرض وترحيفها وتخطيطها على مسافة 70 سم ، ثم يتم زراعة البذور في جور في الثلث العلوي من الخط على مسافة 25 - 50 سم بين الجورة والأخرى وتوضع 3 - 5 بذرات في الجورة ثم تروى الأرض .

5 - كميات البذور:

يلزم الهكتار حوالي 25 - 30 كجم بذور في حالة الزراعة على خطوط.

6 - التسميد:

الذرة الشامية محصول مجهد للأرض ويحتاج إلى كميات كبيرة من العناصر الغذائية لا سيما الأزوت ، وعليه عند زراعة الصنف (سيتي لاجوس 7931) يوصى بإضافة 80-100 كجم نيتروجين/هكتار وعلى دفتين الأولى عند الزراعة والثانية بعد 21 يوماً من الزراعة ، كذلك إضافة 40 - 50 كجم فوسفور/ هكتار عند الزراعة دفعه واحدة . ويمكن إضافة السماد البلدي 15 - 20 طن/ هكتار⁽⁶⁾.




أثر التسميد على نمو محصول الذرة الشامية صنف (سيتي لاجوس 7931)

7 - الترقيع :

تتم عملية الترقيع بعد 7 أيام من الزراعة بإعادة زراعة الجور الغائبة التي لم تنبت.

8 - الخف :


تتم عملية الخف بعد 21 يوماً من الزراعة بخف النباتات الضعيفة وترك نباتين / جوره في حالة الزراعة على مسافة بين الجور 50 سم أو نبات / جوره في حالة الزراعة على مسافة بين الجور 25 سم .



(1) نبات لم ينقصه أي عنصر



علامة نقص الفوسفور



علامة نقص النيتروجين


علامات نقص العناصر⁽³⁾

9- الري:

تتفاوت كميات مياه الري للذرة الشامية في مراحل النمو المختلفة . فتكون قليلة في المراحل الأولى من النمو وتزداد بتقدم العمر وتصل أقصاها في مرحلة التزهير وبدء تكوين الحبوب ، وتحت ظروف سهل تهامة تروي الذرة الشامية خلال موسم النمو 4 - 6 رياض و تكون الفترة بين الريتين والأخرى 10- 15 يوما.



علامة نقص الماء (الجفاف) ⁽¹⁾



بداية الاختبار

بعد شهرين

اختبار تحديد الموضع الموبوء بالأرضة

10- مكافحة الآفات الزراعية :

الحشرات :

النمل الأبيض (الأرضة) :

The White Ants (Termites)

من أهم الآفات التي تهاجم محصول الذرة

الشامية والتي قد تصل نسبة أصابتها إلى

أكثر من 50%.

المكافحة :

الزراعية :

- استخدام الدورة الزراعية.

- حراثة الأرض وتقليل التربة.

- الري المنتظم ، إزالة المخلفات النباتية

البيولوجية⁽⁵⁾:

لهذه الحشرة أعداء كثيرين أهمها الطيور ونوع من النمل المفترس يسمى (F)

الكيميائية:-

بمبيد ريجينت (فبرونيل) Regent(Fipronil) 200sc بمعدل 3 مل / كجم بذور + 10 مل زيت الطعام.

ثاقبات الساق :

Stem Borer

المكافحة :

الزراعية :

- اختيار المواعيد الزراعية المناسبة . و - مكافحة الأعشاب .

البيولوجية :

يوجد لهذه الأفة كثير من المتطفلات والمفترسات منها :

Clypotmorphidae beeae , *Euvipio Sp.* *Hyperchaladia soudonesis*

الكيماوية :

يتم الرش بأحد المبيدات التالية :

- كاربريل 85 % بمعدل 2 جرام / لتر ماء .
- دبتركس 80 % بمعدل 2 جرام / لتر ماء .
- سوميثيون 50 % بمعدل 1.5 سم³ .

المن العسال : Aphid Corn Leaf

المكافحة :

الزراعية :

إزالة الأعشاب ، الاعتناء بالعمليات الزراعية ، اختيار المواعيد الزراعية المناسبة .

البيولوجية :

لهذه الحشرات عدة أعداء طبيعية أهمها أبي العيد ، أسد المن ، ذباب السرفس والتي تنتمي إلى العوائل التالية :

Coccinellidae , *Chrysopidae* , *Syrphidae*

الكيماوية :

الرش بأحد المبيدات التالية :

- دايمثويت 40 % بمعدل 1.5 سم³ / لتر ماء .
- سومسدين 20 % بمعدل 1 سم³ / لتر ماء .
- بريمور 50 % بمعدل 1 جم / لتر ماء .

ديدان كيزان الذرة :

Corn Earworm

الرش بأحد المبيدات التالية :

- ديكاربام 80 % بمعدل 1 جرام / لتر ماء .
- دبتركس 80 % بمعدل 2 جرام / لتر ماء .

أثر الإصابة بديدان الكيزان




الحشائش : Weeds



حشيشة العذار

من أجل تحقيق إنتاجية عالية لابد من الاهتمام بإزالة الحشائش في وقت مبكر لأن نباتات الذرة الشامية الصغيرة حساسة لمنافسة الحشائش ويفضل أن تتم العرزقة الأولى قبل عملية الخفأي بعد حوالي 18 يوماً من الزراعة والعرزقة الثانية بعد 30 يوماً من الزراعة وفي حالة استخدام مبيد الحشائش جيسابريم 80% بمعدل 4 كجم / هكتار بعد الزراعة مباشرة ثم الري ، فإنه يكتفي بالعرزقة الثانية بعد حوالي شهر من الزراعة .



د. علي كمبال يحمل حشيشة العذار

متطفلة *S.hermonthica*

على نباتات الذرة الشامية

حشيشة العذار : *Striga*

على الرغم من عدم ملاحظتها بشكل وبائي في المزرعة البحتية على محصول الذرة الشامية إلا أنها لوحظت في بعض حقول المزارعين ولكن لا تصبح مشكلة في المستقبل حيث وهذه الحشيشة تعتبر من أخطر الحشائش المتطفلة ، ولذا يجب مكافحتها وذلك بجمعها أولاً بأول وقبل ترهيرها وحرقها ، وعند حراثة الأرض الموبوءة يجب عدم نقل المحرات من الأرض الموبوءة إلى الأرض المجاورة الغير موبوءة بحشيشة العذار ويفضل إتباع تعاقب محصولي بحيث يزرع محصول الذرة بالأرض الموبوءة بعد 2 - 3 سنوات .

11- الحصاد :

يتم حصاد المحصول بعد 90 - 100 يوم حسب موعد الزراعة .

12- التخزين:

بعد تجفيف الكيزان في الشمس لمدة 10 - 15 يوم مع التقلية بعد ذلك تتم عملية الدراس (تفرط) وتغربل ومن ثم تعبأ وتخزن وتعد للاستهلاك وفي حالة تخزين البذور للزراعة تعامل بمبيد آفات المخازن وتخزن في مخازن جيدة التهوية .



13- انتقاء البذور

على المزارع اختيار (حجز) الكيزان الممتازة غير المصابة بالأمراض من النباتات القائمة السليمة في وسط الحقل وان تكون خالية من الشوائب وبدور الحشائش وتخزن بطريقة سليمة وان لا تزيد فترة التخزين عن سنتين بعدها تجدد التقاوي (البذور) المنتقاء من مؤسسة إكثار البذور .

المادة العلمية :

- 1.A Publication of The fertilizer institute , Rc 107 - VI - 50 M - 5/71 - EP.
- 2.E.Paterniani; M.M.Goodman - Races of maize in Brazil and adjacent Areas
CIMMYT , 1977 .
- 3.Davidescu,D.,Davidescu V.1982, Evaluation of fertility by plant and soil
analysis , British Library Cataloguing in Publication Data 581. 3'1 Q 769
4. التقارير الفنية لمحطة البحوث الزراعية بتهامة 83 - 2001 م.
5. محرم ا.ع..1988م - أهم الحشرات الاقتصادية التي تصيب الذرة في ج.ع.ي.- هيئة البحوث الزراعية-تعز-1988م
6. مكرد ع.أ 1998م - الدليل الزراعي لسهل تهامة .
7. دليل تقنيات البحوث الزراعية - الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي - ذمار 2000م .
8. كتاب الإحصاء السنوي 2000م - وزارة التخطيط والتنمية - الجهاز المركزي للإحصاء - صنعاء ، 2001م .
9. كتاب الإحصاء الزراعي 2000م ، وزارة الزراعة والري - الإدارة العامة للإحصاء - صنعاء .2001م .
10. الذرة الشامية-رسالة ارشادية رقم (10) .

للاستفسار ولمزيد من المعلومات

يمكنكم الاتصال **بمحطة البحوث الزراعية بتهامة** على العنوان التالي

الجمهورية اليمنية - الحديدة (سردود - الكدن)

Republic of Yemen - Hodeidah - (Surdud - Al Kadan)


Tel:967- 3 - 502022 / 27

Fax:967- 3 - 502023

P.O. Box: Hod. (3760)

البريد الإلكتروني : Email: area.trrs@y.net.ye

البريد الإلكتروني : Email: shurai @y.net.ye



MAIZE - CORN

Variety : (Sete Lagoas 7931)

Prepared By

Ali A . Al-Shurai

Dirhem A.M.Noman Ibrahim M.Al - Mokab'a

Hodeidah - 2002

AGRISH 2002

Republic of Yemen
Ministry of Agriculture & Irrigation
Agricultural Research & Extension Authority
Tihama Agricultural Research Station



Variety : (Sete Lagoas 7931)

Prepared By

Ali A . Al-Shurai

Dirhem A.M.Noman

Ibrahim M.Al - Mokab'a

Hodeidah - 2002

AGRISH 2002